FerkoFer

Mode d'emploi

Dosage:

Distribuer 1 dosette de FerkoFer pour une portée de 12 porcelets 3 fois pendant la période allant de J+2-4 après la mise-bas, jusqu'à ce que les porcelets aient atteint 8 à 12 jours d'âge (soit 10 g, au total, par porcelet, pendant la période).
Distribuer la première dosette 2-4 jours après la mise-bas, la deuxième 3-4 jours plus tard, la troisième 3 à 4 jours après.
Exemple : En cas de mises-bas en fin de semaine, distribuer 1 dosette (fournie) de FerkoFer les lundi,



4 RÈGLES D'OR…

1. LIEU DE DISTRIBUTION

Faites attention au bon emplacement de FerkoFer dans la case, c'est-à-dire dans l'aire d'activité naturelle des porcelets, entre le nid des porcelets et la truie, mais hors de la portée de la truie.

2. AUGETTE SPÉCIALE OU SUPPORT PLAT

FerkoFer doit être distribué dans une augette spéciale Playfeeder®, ou, directement sur un support propre, sec, large, plat avec une superficie rugueuse (sol, dalle en ciment / tapis ou plaque avec reliefs).

3. PÉRIODE DE LA DISTRIBUTION

FerkoFer est distribué 3 fois pendant la période allant de J+2/+4 après la mise-bas, jusqu'à ce que les porcelets aient 8 à 12 jours d'âge.

4. SEUL ALIMENT PENDANT LA PÉRIODE

FerkoFer doit être donné seul. L'appétit du porcelet doit être réservé pour la consommation de FerkoFer, il ne faut donc pas donner un autre aliment ou tout autre substance solide que quelques jours après la dernière distribution !